Exercices de Mathématiques 1

Algèbre linéaire et euclidienne

28 août 2025

Table des matières

Semaine 1 : Barycentre	2
Semaine 2 : Espace euclidien	4
Semaine 3 : Projeté orthogonal	5
Semaine 4 : Algèbre linéaire élémentaire	6
Semaine 5 : Applications linéaires et affines	8
Semaine 6 : Vecteurs propres; valeurs propres	9
Semaine 7 : Déterminant	10
Semaine 8 : Diagonalisation	11
Semaine 9 : Matrices orthogonales et isométries	12
Semaine 10 : Réduction des matrices symétriques	14
Solution des exercices corrigés	17

Semaine 1 : Barycentre

Exercice 1 : (A chercher seul, non corrigé en TD, réponse à la fin)

Représenter un triangle A, B, C du plan ainsi que les barycentres suivants :

$$\begin{array}{l} G_1 = \text{Bar}((A,1);(B,1)) \\ G_2 = \text{Bar}((A,2);(B,2)) \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} G_3 = \text{Bar}((A,2);(B,-1)) \\ G_4 = \text{Bar}((A,1);(B,1);(C,0)) \end{array} \right. \quad \left| \begin{array}{l} G_5 = \text{Bar}((A,1);(B,1);(C,1)) \\ G_6 = \text{Bar}((A,2);(B,1);(C,1)) \end{array} \right.$$

Exercice 2 : Soient A et B deux points distincts. Dans chacun des cas suivants, déterminer deux réels α et β tel que G soit le barycentre du système $\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$.

a) $\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{GB}$ b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{GB} = 3\overrightarrow{GA}$ c) $3\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{GA} = \vec{0}$

Exercice 3 : Soit ABC un triangle. Soient B_1 et C_1 des points des segments $[AC]$ et $[AB]$. Ils s'écrivent comme des barycentres $B_1 = \text{Bar}((A, 1), (B, \beta))$ et $C_1 = \text{Bar}((A, 1), (C, \gamma))$. On note G l'intersection des droites (BB_1) et (CC_1) , et A_1 l'intersection des droites (AG) et (BC) .

- Écrire les points de la droite (BB_1) comme des barycentres.
- Écrire les points de la droite (CC_1) comme des barycentres.
- Écrire A_1 comme barycentre de B et C .
- Étudier le cas particulier où B_1 et C_1 sont les milieux des segments $[AC]$ et $[AB]$, puis plus généralement le cas où $\beta = \gamma$.

Exercice 4 : Dans un tétraèdre $ABCD$, on désigne par I, J, K, L, M et N les milieux des arêtes $[AB], [BC], [CD], [DA], [AC]$ et $[BD]$ et par G_1, G_2, G_3 et G_4 les centres de gravité des triangles BCD, CDA, ABD et ABC .

Démontrer que les sept droites $(AG_1), (BG_2), (CG_3), (DG_4), (IK), (JL)$ et (MN) sont concourantes.

Exercice 5 : Soit ABC un triangle. Soit C_1 le point sur le segment $[AB]$ tel que $BC_1 = 2AC_1$. Soit B_1 le point sur le segment $[AC]$ et que $AB_1 = 2CB_1$. Soit A_1 le point sur la droite (BC) tel que : $A_1 \notin [BC]$ et $BC = 3CA_1$

- Écrire les points de la droite (B_1C_1) comme des barycentres de A, B, C .
- Démontrer que les points A_1, B_1 et C_1 sont alignés.

Exercice 6 : Soit A, B, C trois points du plan.

Déterminer les points M du plan tels que $\|2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\| = \|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\|$

Exercice 7 : Soit $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $(B_i)_{1 \leq i \leq n}$ des points de l'espace, G_A l'isobarycentre de $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ et G_B l'isobarycentre de $(B_i)_{1 \leq i \leq n}$. Montrer que $\sum_{i=1}^n \overrightarrow{A_i B_i} = n\overrightarrow{G_A G_B}$.

Exercice 8 : Soit A, B, C trois points du plan. a, b, c, a', b', c', k des réels tels que

$$\begin{cases} a + b + c \neq 0 \\ a' + b' + c' \neq 0 \\ a + b + c + k(a' + b' + c') \neq 0 \end{cases} \quad \text{et soit} \quad \begin{cases} G = \text{Bar}((A, a), (B, b), (C, c)) \\ G' = \text{Bar}((A, a'), (B, b'), (C, c')) \\ G_k = \text{Bar}((A, a + ka'), (B, b + kb'), (C, c + kc')) \end{cases}$$

Montrer que les points G, G' , et G_k sont alignés.

Exercice 9 : Soit A, B, C trois points du plan. s, t des réels tels que $s + t \neq 0$ et

$$G_A = \text{Bar}((B, s), (C, t)), \quad G_B = \text{Bar}((A, t), (C, s)), \quad \text{et} \quad G_C = \text{Bar}((A, s), (B, t))$$

Montrer que les triangles A, B, C et $G_A G_B G_C$ ont même isobarycentre.

Cas particulier $s = t$.

Exercice 10 : Soit A, B, C, D un rectangle du plan. Déterminer l'ensemble des points M qui vérifient :

$$\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}\| = \|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}\|$$

Exercice 11 : Soient A, B et C trois points distincts, m un réel et G le barycentre de $(A, 1), (B, 1)$ et (C, m^2) . Montrer que G existe pour tout réel m et qu'il décrit un segment que l'on précisera.

Exercice 12 : Soient A et B deux points distincts tels que $AB = 6$, m un réel et G le barycentre de $(A, 3 - m)$ et $(B, 2m - 1)$.

- a) Quel est l'ensemble des valeurs de m pour lesquelles G existe ?
- b) i) Pour quelles valeurs de m le point G est-il le milieu du segment $[AB]$?
 ii) Pour quelles valeurs de m le point G appartient-il au segment $[AB]$?
 iii) G peut-il être le symétrique de A par rapport à B ?
- c) Déterminer l'ensemble décrit par G lorsque m décrit l'intervalle $] - 2; \frac{1}{2}]$.

Exercice 13 : Soient A et B deux points distincts du plan. On note f l'application qui, à tout point M du plan associe le point M' barycentre de $(A, 1)$, $(B, 3)$ et $(M, -2)$. Montrer que f admet un unique point invariant G , en déduire que f est la symétrie de centre G .

Exercice 14 : Centre d'inertie et barycentre : On admet les propriétés suivantes relatives au centre d'inertie d'une plaque homogène d'épaisseur négligeable :

- a) Si la plaque admet un centre de symétrie, c'est aussi son centre d'inertie.
 b) Si la plaque admet un axe de symétrie, alors son centre d'inertie appartient à cet axe.
 c) Une plaque triangulaire admet pour centre d'inertie son centre de gravité.
 d) Si une plaque est constituée de deux parties de centres d'inertie respectifs O_1 et O_2 et de masses m_1 et m_2 , alors son centre d'inertie est le barycentre des points pondérés (O_1, m_1) et (O_2, m_2) .

Déterminer les centres de symétrie des plaques suivantes :

- a) Quatre plaques carrées superposables

- b) Un rectangle ABCE

- c) Cinq disques identiques tangents

- d) Un carré évidé d'un triangle rectangle

Soit un carré $ABCD$ de centre E . On retire le triangle AED pour obtenir une plaque pentagonale.

- e) Un carré évidé d'un rectangle $1/2 \times 2/3$

Semaine 2 : Espace euclidien

Exercice 15: (A chercher seul, non corrigé en TD, réponse à la fin)

Les bases suivantes $(\vec{u}_i, \vec{v}_i)$ de $\mathbb{R}^2$ ou $(\vec{u}_i, \vec{v}_i, \vec{w}_i)$ de $\mathbb{R}^3$ définies ci-après sont-elles orthogonales ? orthonormées ?

$$\begin{aligned} \vec{u}_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} & \vec{v}_1 &= \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} & | & \vec{u}_2 &= \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} & \vec{v}_2 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} & | & \vec{u}_3 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} & \vec{v}_3 &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \\ \vec{u}_4 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} & \vec{v}_4 &= \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} & \vec{w}_4 &= \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} & | & \vec{u}_5 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} & \vec{v}_5 &= \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} & \vec{w}_5 &= \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Exercice 16 :

Soit $B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ une base de $\mathbb{R}^2$ telle que $\|\vec{v}_1\| = 2$, $\|\vec{v}_2\| = 3$, $\langle \vec{v}_1 | \vec{v}_2 \rangle = 5$

Soient $\vec{u}$ et $\vec{w}$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$ qui ont les matrices coordonnées suivantes dans la base B :

$$X_B(\vec{u}) = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad X_B(\vec{w}) = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

a) Calculer $\langle \vec{u} | \vec{w} \rangle$.

b) Est-il possible d'avoir 2 vecteurs tels que $\|\vec{w}_1\| = 2$, $\|\vec{w}_2\| = 3$, $\langle \vec{w}_1 | \vec{w}_2 \rangle = 10$

Exercice 17 :

On considère les vecteurs $\vec{v}_1 = \frac{1}{7}(3, -6, 2)$, $\vec{v}_2 = \frac{1}{7}(-6, -2, 3)$, $\vec{v}_3 = \frac{1}{7}(-2, -3, -6)$ de $\mathbb{R}^3$.

a) Vérifier que $B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$.

b) Déterminer la matrice coordonnées de $\vec{v} = (1, 1, 1)$ dans cette base.

Exercice 18 :

On considère les vecteurs $\vec{v}_1 = (3, -6, 2)$, $\vec{v}_2 = (-6, -2, 3)$, $\vec{v}_3 = (-2, -3, -6)$ de $\mathbb{R}^3$.

a) Vérifier que $B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}^3$.

b) Déterminer la matrice coordonnées de $\vec{v} = (1, 2, 3)$ dans cette base.

Exercice 19 :

Soit E un espace euclidien et x, y deux éléments de E .

Montrer que x et y sont orthogonaux si et seulement si pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\|x + \lambda y\| \geq \|x\|$.

Exercice 20 :

Soient $x_1, x_2, \dots, x_n, n$ réels.

a) Démontrer que : $(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^2 \leq n(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)$

b) On suppose que pour tout entier $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $x_k > 0$ et que $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1$.

Démontrer que : $n^2 \leq \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}$

Exercice 21 : Soit A, B, C, D quatre points distincts du plan et a et b deux réels strictement positifs distincts.

a) Montrer que l'ensemble des points M qui vérifie $\overrightarrow{CM} \cdot \overrightarrow{DM} = 0$ est le cercle de diamètre $[CD]$.

b) Montrer que l'ensemble des points M vérifiant $aAM = bBM$ est un cercle. On pourra factoriser $(aAM)^2 - (bBM)^2$ puis considérer deux barycentres bien choisis.

Exercice 22 : Soit E l'espace vectoriel des matrices 2×2 , $A = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Quelle est la dimension de E ?

b) Pour $M, N \in E$ on pose $\langle M, N \rangle = \text{tr}(M^t N)$. Calculer $\langle A, B \rangle$.

c) Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur E .

d) Quelle est la norme associée ? Calculer $\|A\|$.

e) Déterminer $I^\perp$.

Semaine 3 : Projeté orthogonal

Exercice 23 : On considère les vecteurs $\vec{v}_1 = (1, 1, 1)$, $\vec{v}_2 = (0, 1, 1)$, $\vec{v}_3 = (0, 0, 1)$ de $\mathbb{R}^3$.

- Vérifier que $B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- Utiliser le procédé de Gram-Schmidt pour transformer B en une base orthonormée.
- Mêmes questions avec les vecteurs : $\vec{v}_1 = (1, 0, 1)$, $\vec{v}_2 = (1, 0, 2)$, $\vec{v}_3 = (1, 1, 1)$ de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 24 : (A chercher seul, non corrigé en TD, réponse à la fin)

Mêmes questions avec les vecteurs : $\vec{v}_1 = (1, 0, 1)$, $\vec{v}_2 = (0, 1, 1)$, $\vec{v}_3 = (1, 5, 3)$ de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 25 : Appliquer la méthode d'orthonormalisation de Schmidt pour orthonormaliser les bases définies par :

$$\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$
$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Exercice 26 : Dans chacun des cas suivants, déterminer une base orthonormée de F puis déterminer le projeté orthogonal de $\vec{v}$ sur F , ainsi que la distance entre $\vec{v}$ et F . Déterminer enfin une base de $F^\perp$.

- $F = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0\}$, $\vec{v} = (1, 2, 3)$
- $F = \text{Vect}(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \subset \mathbb{R}^3$, où $\vec{v}_1 = (1, 1, 1)$, $\vec{v}_2 = (2, 3, 4)$, $\vec{v}_3 = (1, 2, 5)$
- $F = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + 3x_2 - 4x_3 + 7x_4 = 0 \text{ et } x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$, $\vec{v} = (1, 2, 3, 4)$
- $F = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5 \mid x_1 + x_2 = 0 \text{ et } x_3 + x_4 + x_5 = 0\}$, $\vec{v} = (1, 2, 3, 4, 5)$

Exercice 27 : Déterminer une base orthonormale du plan vectoriel d'équation $2x - y + 3z = 0$.

Exercice 28 : Déterminer une base orthonormale du plan vectoriel P d'équation $x - y - z = 0$.

Déterminer le projeté orthogonal du vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ sur le plan vectoriel P . En déduire la distance de $\vec{u}$ à P .

Exercice 29 : Soit $E = \mathbb{R}^3$

- Déterminer l'orthogonal du plan vectoriel $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - 3z = 0\}$
- Déterminer la matrice qui représente dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ la projection orthogonale sur le plan $x + 2y - 3z = 0$
- Calculer $p_F(\vec{v})$ pour $\vec{v} = (1, 2, 3)$.
- En déduire la distance entre $\vec{v}$ et F .

Exercice 30 : Soit E l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. On pose $\forall P, Q \in E, \langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(x)Q(x) dx$

- Calculer $\langle X, 1 + X^2 \rangle$.
- Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définit un produit scalaire sur E .
- Appliquer la méthode d'orthonormalisation de Schmidt pour orthonormaliser la base canonique de $E : (1, X, X^2)$.

Exercice 31 : Soit E l'espace vectoriel des fonctions continues sur $[0; 2\pi]$, on pose $\forall f, g \in E,$

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x)g(x) dx$$

- Soient les fonctions f et g définies par $f(x) = x$ et $g(x) = \cos \frac{x}{4}$, calculer $\langle f, g \rangle$.
- Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définit un produit scalaire sur E . Interpréter géométriquement la norme associée.
- Déterminer pour ce produit scalaire le projeté orthogonal de la fonction g sur le sous espace vectoriel des fonctions polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Interprétation.

- d) Déterminer pour ce produit scalaire le projeté orthogonal de la fonction f sur le sous espace vectoriel $H = \{a_0 + a_1 \cos + b_1 \sin, a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\}$.

Exercice 32 (suite de l'exercice 22) : Soit E l'espace vectoriel des matrices 2×2 muni du produit scalaire : $\langle M, N \rangle = \text{tr}(M^t N)$. On note $\mathcal{S}$ le sous-espace vectoriel des matrices symétriques.

- a) Déterminer $\mathcal{S}^\perp$.
- b) Déterminer le projeté orthogonal d'une matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ sur $\mathcal{S}$.

Exercice 33 : Soit E l'espace vectoriel des fonctions continues sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, on pose

$$\forall f, g \in E, \langle f, g \rangle = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)g(x) dx$$

On admet que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définit un produit scalaire sur E .

- a) Soient les fonctions définies par $f_0(x) = 1$, $f_1(x) = x$ et $g(x) = \sin(x)$, calculer $\langle f_0, g \rangle$ et $\langle f_1, g \rangle$.
- b) Soit $H = \{h \in E \mid \exists m, p \in \mathbb{R}, \forall x \in [0; 1], h(x) = mx + p\}$ l'espace vectoriel des fonctions affines, déterminer une base de H , en déduire que H est de dimension 2.
- c) Déterminer le projeté orthogonal G de la fonction g sur H .
- d) De toutes les fonctions linéaires (de la forme $v(x) = \alpha x$), quelle est celle qui est "la plus proche" de g .

Semaine 4 : Algèbre linéaire élémentaire

Exercice 34: (A chercher seul, non corrigé en TD, réponse à la fin)

Lorsqu'elles sont possibles effectuer les opérations suivantes :

$$AE; AB; AC; CA; CF; FC; C^{-1}; A^{-1}; D^{-1}; G^{-1}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}; D = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}; F = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; G = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

Exercice 35: (A chercher seul, non corrigé en TD, réponse à la fin)

Calculer les matrices inverses des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 4 & 4 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 5 \\ 8 & 5 & 7 \\ 4 & -1 & 4 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}; D = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix};$$

Exercice 36 : Soient $\vec{u} = (1; 2; 3)$ et $\vec{v} = (2; 3; 4)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$.

- a) Montrer que $(\vec{u}; \vec{v})$ est libre.
- b) La famille $(\vec{u}; \vec{v})$ est-elle une base de $\mathbb{R}^3$?
- c) Notons H le sous espace vectoriel engendré par $(\vec{u}; \vec{v})$. Quelle est sa dimension ?

$$H = \{\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}; \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$$

- d) Déterminer une équation de H .
- e) Soit $\vec{w} = (1; 1; 1)$, $\vec{w}$ appartient-il à H ?
- f) Compléter $\vec{w}$ en une base de H .

g) Quelles sont les coordonnées de $\vec{w}$ dans la base $(\vec{u}; \vec{v})$?

Exercice 37 : Soit $P = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$, on peut montrer que $P^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 5 \\ -9 & 5 & -11 \\ -7 & 4 & -9 \end{pmatrix}$

a) Résoudre les systèmes :

$$(S) : \begin{cases} x - 2y + 3z = 1 \\ 4x + y + z = -1 \\ x + 2y - 2z = 3 \end{cases} \quad (S') : \begin{cases} x + 4y + z = 1 \\ -2x + y + 2z = -1 \\ 3x + y - 2z = 3 \end{cases}$$

b) On suppose de plus que P est la matrice de passage d'une base $\mathcal{B}$ à une base $\mathcal{B}'$. Soit $\vec{u}$ le vecteur de matrice coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{B}$, quelles sont les coordonnées de $\vec{u}$ dans $\mathcal{B}'$?

c) Soit $\vec{v}$ le vecteur de matrice coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{B}'$, quelles sont les coordonnées de $\vec{v}$ dans $\mathcal{B}$?

d) Soit Π le plan d'équation $2x' + 3y' - z' = 0$, dans la base $\mathcal{B}'$. Déterminer une équation $(ax + by + cz = 0)$ du plan Π dans la base $\mathcal{B}$. Que peut-on dire des vecteurs de coordonnées $(2; 3; -1)$ dans $\mathcal{B}'$ et $(a; b; c)$ dans $\mathcal{B}$?

Exercice 38 : Soit $\mathcal{B} = (\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et $\mathcal{B}' = (\vec{i}'; \vec{j}'; \vec{k}')$ deux bases telles que

$$\begin{cases} \vec{i}' = 2\vec{i} + \vec{j} \\ \vec{j}' = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k} \\ \vec{k}' = -\vec{i} + \vec{j} + \vec{k} \end{cases}$$

et f l'application linéaire définie par $f(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) = (x - y)\vec{i} + (2y - z)\vec{j} - (x + y + z)\vec{k}$

- Déterminer la matrice M de f dans la base $\mathcal{B}$.
- Déterminer la matrice N de f dans la base $\mathcal{B}'$.
- Quelles sont les relations qui lient les matrices M , et N .

Exercice 39 : $f(x, y, z) = x + 2y - z$, $g(x, y, z) = (2x - y, y - 2x)$.

Déterminer les noyaux et les images de f et g . Pour chacun de ces 4 SEV on déterminera une base.

Exercice 40 : Soit f définie par $f(x, y, z) = (2x - y + z, y + x)$.

- Déterminer le noyau et l'image de f .
- Déterminer une base du noyau de f puis une base de l'image de f .
- Écrire la matrice M de f relativement aux bases canoniques : $(1; 0; 0)$, $(0; 1; 0)$, $(0; 0; 1)$ et $(1; 0)$, $(0; 1)$.

Exercice 41 : Soit E l'ensemble des solutions définies sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $xy'' - y + xy = 0$.

- Montrer que E est un sous-espace vectoriel.
- Écrire E comme noyau d'une application linéaire.

Exercice 42 : Soit $M = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$, déterminer $\max_{\|X\|=1} \|MX\|$.

Exercice 43 : Soit $\mathcal{B} = (\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ une base orthonormée et $\mathcal{B}' = (\vec{i}'; \vec{j}'; \vec{k}')$, $\mathcal{B}'' = (\vec{i}''; \vec{j}''; \vec{k}'')$ telles que

$$\begin{cases} \vec{i}' = \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{j} \\ \vec{j}' = \frac{1}{\sqrt{3}}\vec{i} - \frac{1}{\sqrt{3}}\vec{j} - \frac{1}{\sqrt{3}}\vec{k} \\ \vec{k}' = \frac{1}{\sqrt{6}}\vec{i} - \frac{1}{\sqrt{6}}\vec{j} + \frac{2}{\sqrt{6}}\vec{k} \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{i}'' = \vec{i} + \vec{j} \\ \vec{j}'' = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k} \\ \vec{k}'' = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k} \end{cases}$$

a) Les bases $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$ sont-elles orthonormées ?

b) La matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est $P' = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$, déterminer P'' la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}''$.

c) Soit $\vec{u} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 5\vec{k}$ déterminer les coordonnées de $\vec{u}$ dans les bases $\mathcal{B}'$ puis $\mathcal{B}''$.

d) Soit P le plan d'équation $2x + 3y + 5z = 0$ dans la base $\mathcal{B}$. En donner une équation dans la base $\mathcal{B}'$ puis dans la base $\mathcal{B}''$.

e) Lien entre l'équation du plan et le vecteur $\vec{u}$.

Exercice 44 : Soit E l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. On considère l'endomorphisme Φ qui à un polynôme P associe le polynôme $P' + P$. Déterminer la matrice de Φ dans la base $(1; X; X^2; X^3)$. déterminer le noyau et l'image de Φ .

Semaine 5 : Applications linéaires et affines

Exercice 45 : Soit f une application affine d'un espace vectoriel E dans lui-même, $A, B \in E$ tel que $A \neq B$, et $f(A) = A$ et $f(B) = B$, montrer que f laisse les points de la droite (AB) invariants, c'est à dire. : $\forall M \in (AB), f(M) = M$.

sol : $M = A + t\vec{AB}$, $f(M) = f(A) + \vec{f}(A + t\vec{AB}) = f(A) + \vec{f}(A) + t\vec{f}(\vec{AB}) = f(A) + t(\vec{f}(B) - \vec{f}(A)) = A + t\vec{AB}$.

Exercice 46 : Quelle est la forme d'une représentation paramétrique du plan passant par $A = (x_A, y_A, z_A)$, et dont une base est formée des deux vecteurs $\vec{u} = (x_u, y_u, z_u)$ et $\vec{v} = (x_v, y_v, z_v)$. Les représentations paramétriques suivantes définissent-elles le même plan ?

$$P_1 : \begin{cases} x = 2 + \lambda + 2\mu \\ y = 2 + 2\lambda + \mu \\ z = 1 - \lambda - \mu \end{cases} \quad P_2 : \begin{cases} x = 1 + 3\lambda - \mu \\ y = 3 + 3\lambda + \mu \\ z = 1 - 2\lambda \end{cases}$$

sol : oui, on peut trouver une équation cartésienne ou montrer une inclusion

Exercice 47 : Déterminer une représentation paramétrique, de la droite de vecteur directeur $\vec{u} = (1, 2, 3)$, et sécante avec les deux droites d'équation $\begin{cases} x = 0 \\ z = 1 \end{cases}$ et $\begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}$

sol : $x = 1 + t \quad y = 2t \quad z = 4 + 3t$

Exercice 48 : Soient D et D' les droites d'équation $2x - 3y = 0$ et $x - 7y = 0$ dans une base $\mathcal{B}$ du plan, soit $\mathcal{S}$ la symétrie d'axe D parallèlement à D' .

a) Déterminer une base $\mathcal{B}'$ dans laquelle la matrice de $\mathcal{S}$ est très simple.

b) Déterminer la matrice de $\mathcal{S}$ dans $\mathcal{B}'$.

c) Déterminer la matrice de $\mathcal{S}$ dans $\mathcal{B}$?

Exercice 49 : Soit h l'homothétie de centre 0 et de rapport 5, et p la projection sur le plan d'équation $x + 2y + 3z = 0$ parallèlement au vecteur $(-1; 1; 0)$. Déterminer la matrice de $h \circ p$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 50 : Une matrice N est dite nilpotente s'il existe un entier k tel que $N^k = 0$.

Montrer qu'une matrice diagonalisable est nilpotente si et seulement si elle est nulle.

Indication : considérer d'abord le cas où la matrice est diagonale.

Exercice 51 : Déterminer de deux façons différentes l'expression de $\mathcal{S}$ la symétrie orthogonale par rapport au plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + y - 2z = 0$.

a) En revenant à la définition de la symétrie par rapport à $\mathcal{P}$, parallèlement à $\mathcal{P}^\perp$.

b) En écrivant la matrice de $\mathcal{S}$ dans une base bien adaptée à $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}^\perp$, puis en effectuant un changement de base.

Exercice 52 : Soit $\vec{n} = (a, b, c)$ un vecteur unitaire de $\mathbb{R}^3$, $\mathcal{S}$ la symétrie orthogonale par rapport au plan $\mathcal{P}$ d'équation $ax + by + cz = 0$. Déterminer la matrice de $\mathcal{S}$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$. sol :

$$M = \begin{pmatrix} 1 - 2a^2 & -2ab & -2ac \\ -2ab & 1 - 2b^2 & -2bc \\ -2ac & -2bc & 1 - 2c^2 \end{pmatrix}$$

Exercice 53 : Soit $p : E \rightarrow E$ une application linéaire vérifiant $p^2 = p$.

- Montrer que $\text{im } p \cap \ker p = \{\vec{0}\}$.
- Montrer que $\text{im } p + \ker p = E$.
- Montrer que p est la projection sur $\text{im } p$ parallèlement à $\ker p$.

Semaine 6 : Vecteurs propres ; valeurs propres

Exercice 54 : Soit les matrices $M = \begin{pmatrix} 12 & -15 \\ 6 & -7 \end{pmatrix}$ et $V = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- montrer que V est un vecteur propre de M , déterminer la valeur propre λ_0 associée à V .
- Déterminer tous les vecteurs propres associés à λ_0 . Déterminer le sous espace propre associé à λ_0 .
- Montrer que 2 est une autre valeur propre de M .
- Soit W un vecteur propre associé à la valeur propre 2, et f l'application linéaire de matrice M dans la base canonique. Quelle est la matrice de f dans la base (V, W) . sol : $\lambda_0 = 3$

Exercice 55 : Soit les matrices $M = \begin{pmatrix} 5 & -6 & 5 & 9 \\ 3 & -3 & 4 & 7 \\ 3 & -6 & 7 & 9 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ et $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, montrer que V est un vecteur propre de M , déterminer la valeur propre λ_0 associée, déterminer tous les vecteurs propres associés à λ_0 . Déterminer le sous espace propre associé à λ_0 . sol : $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $W = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

Exercice 56 : Déterminer les réels a et b tels que la matrice $M = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ b & -1 & 1 \\ b & 1 & 1 \end{pmatrix}$ admette $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ comme vecteur propre.

Exercice 57 : Soit $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs d'un espace vectoriel de dimension fini E , et f une application linéaire telle que $\vec{u}$ est un vecteur propre associé à la valeur propre 1 ; $\vec{v}$ est un vecteur propre associé à la valeur propre 2 et $\vec{w}$ est un vecteur propre associé à la valeur propre 3.

- Montrer que la famille $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une famille libre.
- On complète $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ en une base $\mathcal{B}$ de E , que peut-on dire de la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.

Exercice 58 : Soit E l'espace de dimension infinie des fonctions dérivables de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, et Ψ l'application de E dans E définie par $\forall f \in E, \Psi(f) = f'$. Montrer que tous les réels sont valeur propre et pour chacun déterminer le sous espace propre associé.

Exercice 59 : Soit E l'espace de dimension infinie des polynômes à coefficients réels, et f l'application linéaire de E dans E définie par $\forall P \in E, f(P) = XP'$. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de f .

Exercice 60 : Soit E l'espace vectoriel des suites réelles indexée par $\mathbb{N}$. Soit Φ l'endomorphisme de E qui à une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ associe la suite $(u_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$.

- Soit la suite définie par $u_n = n$. Quelle est son image par Φ ? Écrire les premiers termes.
- Soit la suite définie par $u_n = 2^n$. Quelle est son image par Φ ? Écrire les premiers termes.
- Déterminer les vecteurs propres de Φ ? Puis l'ensemble des valeurs propres de Φ .

Semaine 7 : Déterminant

Exercice 61 : Calculer les déterminants suivants :

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} a & a^2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} ab & a^2 & a \\ b & 2 & 6 \\ b & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a+b & c+a & b+c \\ ab & ac & bc \end{vmatrix} \quad \Delta_4 = \begin{vmatrix} 2a & 2a & abc \\ 2b & abc & 2b \\ abc & 2c & 2c \end{vmatrix}$$

Exercice 62 (Distance d'un point à une droite) :

Soit D la droite de $\mathbb{R}^2$ passant par le point $A = (a, b)$ et de vecteur directeur $\vec{u} = (\alpha, \beta)$, $M_0 = (x_0, y_0)$ et H le projeté orthogonal de M_0 sur D .

- D est-elle un sous espace vectoriel ?
- Montrer que $|\text{Det}(\overrightarrow{AM_0}, \vec{u})| = |\text{Det}(\overrightarrow{HM_0}, \vec{u})| = |\overrightarrow{HM}| |\vec{u}|$.
- En déduire que la distance de M_0 à D est égale à :

$$d = \frac{|\beta(x_0 - a) - \alpha(y_0 - b)|}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$$

- En déduire que la distance de M_0 à la droite d'équation $ux + vy + w = 0$ est :

$$d = \frac{|ux_0 + vy_0 + w|}{\sqrt{u^2 + v^2}}$$

Exercice 63 : Soit E un espace euclidien. On appelle matrice de Gram d'une famille $(\vec{v}_i)_{1 \leq i \leq n}$ de vecteurs de E , la matrice :

$$G(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n) = \begin{pmatrix} \langle \vec{v}_1 | \vec{v}_1 \rangle & \langle \vec{v}_1 | \vec{v}_2 \rangle & \dots & \langle \vec{v}_1 | \vec{v}_n \rangle \\ \langle \vec{v}_2 | \vec{v}_1 \rangle & \langle \vec{v}_2 | \vec{v}_2 \rangle & \dots & \langle \vec{v}_2 | \vec{v}_n \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle \vec{v}_n | \vec{v}_1 \rangle & \langle \vec{v}_n | \vec{v}_2 \rangle & \dots & \langle \vec{v}_n | \vec{v}_n \rangle \end{pmatrix}$$

Le déterminant de cette matrice, noté $g(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n)$, est appelé déterminant de Gram de la famille $(\vec{v}_i)_{1 \leq i \leq n}$.

- On considère les vecteurs $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ de $\mathbb{R}^2$.
 - Vérifier que $B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
 - Calculer la matrice de Gram de B .
 - La base B est-elle orthonormée ?
- Propriétés du déterminant de Gram
 - Montrer que $g(\vec{0}, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n) = 0$
 - Montrer que $\forall k \in \mathbb{R}, g(k\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n) = kg(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n)$
 - Montrer que $\forall k \in \mathbb{R}, g(\vec{v}_1 + k\vec{v}_2, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n) = g(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n)$
 - Montrer que les $(\vec{v}_i)$ forment une famille libre si et seulement si $g(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n) \neq 0$.
- Montrer que la famille $(\vec{v}_i)_{1 \leq i \leq n}$ est orthogonale si et seulement si $G(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n)$ est diagonale.
- Montrer que la famille $(\vec{v}_i)_{1 \leq i \leq n}$ est orthonormée. si et seulement si $G(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n)$ est égale à la matrice identité.
- Soit F un sous espace vectoriel de E dont $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k)$ est une base et $\vec{v}$ un vecteur de E .

- i) Montrer que $g(\vec{v}, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k) = g(\vec{v} - p_F(\vec{v}), \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k)$.
- ii) Déterminer la première colonne de la matrice $G(\vec{v} - p_F(\vec{v}), \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k)$
- iii) En déduire que $g(\vec{v}, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k) = \|\vec{v} - p_F(\vec{v})\| g(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k)$.
- iv) Montrer que la distance de $\vec{v}$ à F est égale à $\frac{g(\vec{v}, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k)}{g(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k)}$
- v) Déterminer la distance entre le vecteur $(1; 2; 3)$ et le plan engendré par les vecteurs $(1, -1, 2)$ et $(2; 1; -2)$. sol :

Exercice 64 : Soit B une base de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice de Gram est $G = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$

Soient u et w deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$ qui ont les matrice coordonnées suivants dans la base B :

$$X_B(u) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad X_B(w) = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Calculer $\langle u | w \rangle, \|u\|, \|v\|$.

Semaine 8 : Diagonalisation

Exercice 65 : Montrer sans utiliser le polynôme caractéristique que la matrice $M = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 6 \\ -4 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

admet 1 comme valeur propre et déterminer le sous espace propre associé à 1 : E_1 . Montrer que 2 n'est pas valeur propre. Le vecteur $U = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est-il un vecteur propre de M ?

Exercice 66 : Soient A et B des matrices carrées de même dimension.

- a) Montrer que si λ est une valeur propre de AB associé au vecteur propre U alors λ est une valeur propre de BA , on pourra considérer à part le cas où $BU = 0$.
- b) Montrer ce résultat en utilisant le polynôme caractéristique.

Exercice 67 : Diagonaliser les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -4 & -15 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 7 & -10 \\ 4 & -7 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 3a+1 & -3a-3 \\ a+1 & -a-3 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 6 \\ -4 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 4 & 7 & 8 \\ -4 & -8 & -9 \end{pmatrix} \quad G = \begin{pmatrix} -3 & -8 & -4 \\ -5a-11 & -3a-28 & -2a-14 \\ 10a+24 & 6a+62 & 4a+31 \end{pmatrix}$$

$$\text{sol : } \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6/5 & -1/5 \\ 2/5 & -2/5 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & -5 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/2 & 3/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercice 68 : (A chercher seul, non corrigé en TD, réponse à la fin)

Diagonaliser la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & -8 & 6 \\ -1 & -8 & 7 \\ 1 & -14 & 11 \end{pmatrix}$

Exercice 69 : Soit A, P, D trois matrices telles que $A = PDP^{-1}$, montrer que

i) $\det(A) = \det(D)$

ii) $\text{tr}(A) = \text{tr}(D)$

iii) $P_A = P_D$

Exercice 70 :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -5 & -2 \\ -5 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

- a) Diagonaliser M .
- b) Donner une interprétation géométrique de la transformation associée à la matrice M dans une base $\mathcal{B}$.

Exercice 71 : Soit E un espace vectoriel de dimension fini et p un projecteur, c'est à dire un endomorphisme de E ayant la propriété : $p \circ p = p$. Montrer que les seuls valeurs propres que peut avoir un projecteur sont 1 et 0. Montrer qu'un projecteur est toujours diagonalisable. Pour cela on pourra montrer que tout vecteur s'écrit comme somme d'un vecteur propre associé à 1 et d'un vecteur propre associé à 0.

Exercice 72 : Soit $s : E \rightarrow E$ une application linéaire vérifiant $s^2 = \text{id}$. On admet qu'une telle application est diagonalisable.

- a) Déterminer les valeurs propres possibles pour s .
- b) Montrer que si s possède deux valeurs propres alors s est une symétrie dont on déterminera les éléments caractéristiques.

Exercice 73 : [dur] Soit A une matrice $n \times n$ qui ne contient que des 0 sauf sur la première et la dernière colonne ainsi que sur la première et la dernière ligne ou il y a des 1.

- a) Si $n = 2$, A est-elle diagonalisable ?
- b) Si $n \geq 3$, montrer que 0 est une valeur propre de A , et que le sous espace propre associé est de dimension supérieur à $n - 2$.
- c) Montrer que les seules valeurs non nulles de λ pour lesquelles le système $AX = \lambda X$ a des solutions ($X \neq 0$) sont $\lambda_1 = 1 + \sqrt{2n - 3}$ et $\lambda_2 = 1 - \sqrt{2n - 3}$
- d) En déduire que A est diagonalisable.

Exercice 74 : Montrer que si λ est une valeur propre de M , alors λ est une valeur propre de M^t .

Semaine 9 : Matrices orthogonales et isométries

Exercice 75 :

- a) Parmi les matrices suivantes, lesquelles représentent des isométries dans une bon ?

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} ; \quad B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} ; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} ; \quad D = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 & -6 & -2 \\ -6 & -2 & -3 \\ 2 & 3 & -6 \end{pmatrix}$$

- b) Soient $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Calculer $\langle X | Y \rangle, \langle AX | AY \rangle, \langle BX | BY \rangle, \|X\|, \|AX\|, \|BX\|$. Conclure.

Exercice 76 :

- a) Montrer que les valeurs propres réelles d'une matrice orthogonale appartiennent à $\{1; -1\}$.
- b) Montrer que le déterminant d'une matrice orthogonale est égal à ± 1 .

Exercice 77 : Soit M une matrice orthogonale 2×2 .

a) On suppose que le déterminant de M est égal à -1 .

- i) Montrer que le polynôme caractéristique de M possède deux racines réelles différentes.
- ii) Montrer que M est diagonalisable.
- iii) Montrer que deux vecteurs propres associés à deux valeurs propres différentes sont orthogonaux.
- iv) Montrer qu'il existe T orthogonale tels que $M = P \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} {}^tP$.

b) On suppose que le déterminant de M est égal à 1 . Montrer qu'il existe θ tel que :

$$M = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

c) Donner une interprétation géométrique de ce qui précède.

Exercice 78 : Un invariant important la trace.

Soit M une matrice carrée on appelle trace de M la somme des éléments diagonaux de M . On la note $\text{tr}(M)$.

a) Calculer la trace des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} -6 & 6 \\ -12 & 11 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ 9 & -4 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

b) Montrer que pour deux matrices carrées A et B on a $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

Exercice 79 :

Soit $\mathcal{E}$ l'ensemble des matrices 3×3 de la forme $M = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & N \\ 0 & & \end{pmatrix}$ avec $N = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$.

- a) Montrer que $\mathcal{E}$ est un sous espace vectoriel dont on déterminera la dimension.
- b) Montrer que le produit de deux matrices de $\mathcal{E}$ appartient encore à $\mathcal{E}$.
- c) Donner une CNS sur N et α pour qu'une matrice M de cette forme soit inversible et déterminer son inverse.
- d) Calculer lorsqu'il est défini le produit :

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & N \\ 0 & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha' & 0 & 0 \\ 0 & N' \\ 0 & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & N \\ 0 & & \end{pmatrix}^{-1}$$

Exercice 80 : (suite des exercices 76, 77, 78 et 79 pour les matrices 3×3)

Soit f un endomorphisme d'un espace euclidien E de dimension 3 et M la matrice de f dans une base de E . On suppose que M est orthogonale.

- a) Montrer que contrairement au cas de l'exercice 77 la matrice M a une valeur propre réelle, on pourra étudier le degré de son polynôme caractéristique. En déduire que soit 1 soit -1 est une valeur propre de M , notons ε une valeur propre de f et $\vec{u}$ un vecteur propre associé. On note $H = \mathbb{R}\vec{u}$ et $F = H^\perp = \{\vec{v} \in E; \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0\}$ l'orthogonal de H .
- b) Si M est diagonalisable dans $\mathbb{R}$ quelles sont les diagonales possibles.
- c) Si M n'est pas diagonalisable dans $\mathbb{R}$:

- i) Montrer que si $\vec{v} \in H$ alors $f(\vec{v}) \in H$.
- ii) Montrer que si $\vec{v} \in F$ alors $f(\vec{v}) \in F$. On pourra calculer la norme de $f(\vec{u} + \vec{v})$.

- iii) Soit $\vec{u}_2, \vec{u}_3$ une base de F . Montrer que la matrice de f dans la base $(\vec{u}, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ appartient à $\mathcal{E}$ de l'exercice 79, montrer que la matrice N correspondante est orthogonale.
- iv) Montrer que si N est diagonalisable alors M l'est aussi.
- v) En déduire que dans la base $(\vec{u}, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ la matrice de f est de la forme

$$\begin{pmatrix} \epsilon & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

- d) Classer les matrices orthogonales 3×3 , interprétation géométrique.
- e) Soit A la matrice d'une rotation, déterminer l'angle de cette rotation, expliquer comment l'on pourrait trouver l'axe de la rotation.

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

Exercice 81 : Soit f_θ une rotation de l'espace d'axe Δ .

- a) D'après l'exercice 80, il existe une base orthonormale dans laquelle la matrice de f est

$$M(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}, \text{ on suppose que } \theta \text{ est petit et on note } M_a \text{ l'approximation}$$

affine de M , c'est à dire que M_a est la partie principale du DL_1 de $\theta \mapsto M(\theta)$ en 0.

- i) Déterminer M_a .
- ii) M_a est-elle orthogonale ?
- iii) Montrer qu'il existe un vecteur V_a tel que pour toute matrice colonne U on ait :
 $M_a U = U + V_a \wedge U$.
- b) On voudrait trouver un résultat équivalent pour une rotation d'axe de vecteur directeur $\vec{n} = (a, b, c)$ et d'angle très petit θ .

Semaine 10 : Réduction des matrices symétriques

Exercice 82 :

Soit $E = \mathbb{R}^4$. Soient $\vec{u}_1 = (1, 0, 1, 0)$, $\vec{u}_2 = (1, -1, 1, -1)$ et $F = \text{Vect}(\vec{u}_1, \vec{u}_2)$

- a) Déterminer une base orthonormée de F et l'étendre en une base orthonormée de $\mathbb{R}^4$, cela peut s'obtenir sans calcul, grâce à la forme très particulière de $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$.
- b) Déterminer la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^4$ de la projection orthogonale sur F .

Exercice 83 : Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

- a) M est-elle symétrique ?
- b) Déterminer les sous espaces propres de M , sont-ils orthogonaux ?
- c) Déterminer une base orthonormale de vecteurs propres.
- d) Déterminer P orthogonale et D diagonale telles que $M = PDP^t$.

Exercice 84 : Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$.

- M est-elle symétrique ? Quel est son rang ?
- Déterminer les sous espaces propres de M , sont-ils orthogonaux ?
- Déterminer une base orthonormale de vecteurs propres.
- Déterminer P orthogonale et D diagonale telles que $M = PDP^t$.

Exercice 85 : Soit la matrice $M = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ -2 & -1 & -2 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

- M est-elle symétrique ?
- M est-elle orthogonale ?
- M est-elle diagonalisable ?
- Déterminer une matrice P orthogonale, et une matrice D diagonale telle que $M = PDP^{-1}$.
- Donner une interprétation géométrique à l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$, dont la matrice est M dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 86 : Soit S une matrice symétrique telle que $S^5 = I$, montrer que $S = I$.

Soit S une matrice symétrique telle que $S^4 = I$, montrer que $S^2 = I$, a-t-on toujours $S = I$?

Exercice 87 : Soit M une matrice et P une matrice orthogonale telles que PSP^t est diagonale, montrer que M est symétrique.

Exercice 88 : Montrer que pour une matrice symétrique S dont la plus grande valeur propre est λ_M et la plus petite est λ_m , on a pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$,

$$\lambda_m \|X\| \leq \|SX\| \leq \lambda_M \|X\|$$

Exercice 89 : On pourra avec intérêt relire les énoncés des exercices 32 et 78

Soit A une matrice carré $n \times n$.

- Montrer que la matrice $S = {}^tAA$ est diagonalisable. On note $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ ses valeurs propres.

- Montrer que $\text{tr}(S) = \sum_{k=1}^n \lambda_k = \sum_{1 \leq i,j \leq n} A_{i,j}^2$.

- Soit X_1 un vecteur propre associé à λ_1 , en calculant tX_1SX_1 , montrer que $\lambda_1 \geq 0$.
- En considérant une b.o.n. de vecteurs propres, montrer que pour toute matrice colonne X , $n \times 1$ on a :

$$\sqrt{\lambda_1} \|X\| \leq \|AX\| \leq \sqrt{\lambda_n} \|X\|$$

- Montrer qu'il existe des matrices colonnes non nulle pour lesquelles on a égalité.

Exercice 90 : Soit Γ la conique d'équation

$$5x^2 + 2\sqrt{3}xy + 7y^2 = 1$$

dans la base canonique. Déterminer une base orthonormée dans laquelle l'équation de Γ est réduite.

Exercice 91 : Même question avec la conique d'équation $x^2 + 2xy - y^2 + x - 2y = 1$.

Exercice 92 : Soit S une matrice symétrique.

- En supposant que toutes les valeurs propres de S sont positives, et en diagonalisant S montrer qu'il existe une matrice symétrique T telle que $T^2 = S$.
- Appliquer ce qui précède à la matrice $S_1 = \begin{pmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 10 \end{pmatrix}$.

Exercice 93 :

- a) Soit S une matrice symétrique à deux lignes, pour $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, calculer ${}^tX S X$.
- b) Soit S une matrice symétrique à n lignes et X une matrice colonne à n lignes, calculer à l'aide des coefficients de X et ceux de S la quantité : ${}^tX S X$.
- c) Soit S une matrice symétrique telle que pour toute matrice colonne X on ait :

$${}^tX S X \geq 0$$

Montrer que toutes les valeurs propres de S sont positives. On pourra considérer une valeur propre et pour X un vecteur propre associé.

- d) Montrer que la réciproque est vraie, on pourra diagonaliser S dans une base orthonormée.
- e) En écrivant la somme suivante comme une somme de carrés montrer que :

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R}, 6x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xy - 2yz \geq 0$$

En déduire que les valeurs propres de $S_2 = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ sont positives.

- f) En vous inspirant de la méthode précédente montrer que les valeurs propres de la matrice

$$T = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 6 & -3 \\ 0 & -3 & 2 \end{pmatrix} \text{ sont positives.}$$

Exercice 94 : Soit E un espace euclidien, S sa sphère unité, $S = \{\vec{u} \in E / \|\vec{u}\| = 1\}$ et $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme symétrique. Pour tout vecteur $\vec{u} \in S$, on peut décomposer $f(\vec{u})$ sur $\text{vect}(\vec{u})$ et $\vec{u}^\perp$, on note $g(\vec{u})$ le projeté orthogonal de $f(\vec{u})$ sur $\text{vect}(\vec{u})$, et $h(\vec{u})$ le projeté orthogonal de $f(\vec{u})$ sur $\vec{u}^\perp$. On note $\|h\| = \max\{\|h(\vec{u})\| \in \mathbb{R} / \vec{u} \in E\}$.

- a) Que vaut $h(\vec{v})$ lorsque $\vec{v}$ est un vecteur propre de f .
- b) Montrer que $h(\vec{u}) = f(\vec{u}) - (f(\vec{u}) \cdot \vec{u})\vec{u}$.
- c) Montrer que $\|h(\vec{u})\|^2 = \|f(\vec{u})\|^2 - (f(\vec{u}) \cdot \vec{u})^2$.
- d) Soit $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ une base orthonormale de vecteurs propres de f tq $f(\vec{e}_i) = \lambda_i \vec{e}_i$, montrer que pour tout élément de $S : \sum u_i \vec{e}_i$

$$\left\| h \left(\sum_{i=1}^n u_i \vec{e}_i \right) \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 u_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i^2 \right)^2$$

- e) Dans cette question on suppose que $n = 2$, montrer que $\|h\| = \frac{1}{2}|\lambda_1 - \lambda_2|$.
- f) Dans cette question on suppose que f est une projection orthogonale, montrer que $\|h\| = \frac{1}{2}$.
- g) Dans le cas général, montrer que $\|h\| \geq \frac{1}{2}(\max(\lambda_i) - \min(\lambda_i))$.

sol : $h(\vec{v}) = \vec{0}$
 le projeté orthogonal de $f(\vec{u})$ sur $\mathbb{R}\vec{u}$ est $(f(\vec{u}) \cdot \vec{u})\vec{u}$
 $f(\vec{u}) = \sum u_i \vec{e}_i$, $(f(\vec{u}) \cdot \vec{u}) = \sum \lambda_i u_i^2$.

Pour $n = 2$, on a $\|h\|^2 = (\lambda_1 - \lambda_2)^2 u_1^2 u_2^2$, or $u_1 u_2$ est maximum pour $u_1 = 1/\sqrt{2}$. Pour une projection $\lambda = 0$ ou 1

Exercice 95 : Représentation plane de Mohr d'une matrice symétrique.

Soit M la matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ avec $\det(M) \neq 0$ et $a > c$. On note $\mathcal{C}$ le cercle de diamètre $[AB]$ avec $A(a; b)$ et $B(c; -b)$. On note λ_1, λ_2 les deux valeurs propres de M avec $\lambda_1 \geq \lambda_2$.

- a) Écrire λ_1 en fonction de a, b et c , puis les coordonnées d'un vecteur propre $\vec{u}$ associé à λ_1 .
- b) Écrire $\tan(\vec{i}, \vec{u})$ en fonction de a, b et c .
- c) Déterminer l'équation du cercle $\mathcal{C}$.
- d) Montrer que les deux points d'intersections de $\mathcal{C}$ et de l'axe (Ox) ont pour abscisse les valeurs propres de M . On note L_1 celui qui a la plus grande abscisse et L_2 l'autre.
- e) Montrer que $\tan(\vec{i}, \vec{u}) = \tan(\vec{i}, \overrightarrow{L_2 A})$, interprétation pour trouver graphiquement l'angle $(\vec{i}, \vec{u})$.

Solutions des exercices corrigés

Solution de l'exercice 1 : $\overrightarrow{AG}_1 = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AG}_2 = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AG}_3 = -\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AG}_4 = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AG}_5 = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{AG}_6 = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$;

Solution de l'exercice 15 $\vec{u}_1 \cdot \vec{v}_1 \neq 0$ donc base non orthogonale. $\vec{u}_2 \cdot \vec{v}_2 = 0$ donc base orthogonale, $\vec{u}_2 \cdot \vec{u}_2 \neq 1$ donc pas orthonormale. $\vec{u}_3 \cdot \vec{v}_3 = 0$ donc base orthogonale, $\vec{u}_3 \cdot \vec{u}_3 = 1$ et $\vec{v}_3 \cdot \vec{v}_3 = 1$ donc base orthonormale. $\vec{u}_4 \cdot \vec{v}_4 = 0$ et $\vec{u}_4 \cdot \vec{w}_4 = 0$ et $\vec{v}_4 \cdot \vec{w}_4 = 0$ donc base orthogonale, $\vec{u}_4 \cdot \vec{u}_4 \neq 1$ donc base non orthonormale. $\vec{v}_5 \cdot \vec{w}_5 \neq 0$ donc base non orthogonale.

Solution de l'exercice 24 : $\vec{e}_1 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$, $\vec{e}_2 = (-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}})$, $\vec{e}_3 = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}})$

Solution de l'exercice 34 : $AE = \begin{pmatrix} 7 \\ 10 \end{pmatrix}$ $AB = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 2 & -8 \end{pmatrix}$ $CA = \begin{pmatrix} 1 & -5 & -2 \\ 3 & -8 & -4 \end{pmatrix}$ $CF = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$

$FC = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ $C^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ $D^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1/3 & -1/6 \\ 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$, AC, A^{-1}, G^{-1} n'ont pas de sens.

Solution de l'exercice 35 : $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 4/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -27 & 1 & 32 \\ 4 & 0 & -5 \\ 28 & -1 & -33 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5/2 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3/2 & 7/2 \end{bmatrix}$

Solution de l'exercice 68 :

Étape 1 : Calcul du polynôme caractéristique

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

On a :

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} -\lambda & -8 & 6 \\ -1 & -8 - \lambda & 7 \\ 1 & -14 & 11 - \lambda \end{pmatrix}$$

Calculons le déterminant par développement selon la première ligne :

$$\det(A - \lambda I) = -\lambda \cdot \begin{vmatrix} -8 - \lambda & 7 \\ -14 & 11 - \lambda \end{vmatrix} + 8 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 7 \\ 1 & 11 - \lambda \end{vmatrix} + 6 \cdot \begin{vmatrix} -1 & -8 - \lambda \\ 1 & -14 \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 3\lambda^2 + 4\lambda - 12$$

Étape 2 : Résolution de l'équation caractéristique On cherche les racines du polynôme :

$$\lambda^3 - 3\lambda^2 - 4\lambda + 12$$

On remarque que 2 est racine On factorise :

$$\lambda^3 - 3\lambda^2 - 4\lambda + 12 = (\lambda - 2)(\lambda^2 - \lambda - 6)$$

Puis :

$$\lambda^2 - \lambda - 6 = (\lambda - 3)(\lambda + 2)$$

Les valeurs propres sont :

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 3, \quad \lambda_3 = -2$$

Il y a 3 valeurs propres distinctes, la matrice est diagonalisable, et pour obtenir une base de vecteurs propres il suffit de choisir un vecteur propre associé à chacune des valeurs propres.

Étape 3 : Calcul des vecteurs propres

Pour $\lambda = 2$, On résout $(A - 2I)\vec{v} = 0$: $A - 2I = \begin{pmatrix} -2 & -8 & 6 \\ -1 & -10 & 7 \\ 1 & -14 & 9 \end{pmatrix}$ $E_2 = \ker(A - 2I) = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Pour $\lambda = 3$, On résout $(A - 3I)\vec{v} = 0$: $A - 3I = \begin{pmatrix} -3 & -8 & 6 \\ -1 & -11 & 7 \\ 1 & -14 & 8 \end{pmatrix}$ $E_3 = \ker(A - 3I) = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$

Pour $\lambda = -2$, on résout $(A + 2I)\vec{v} = 0$: $A + 2I = \begin{pmatrix} 2 & -8 & 6 \\ -1 & -6 & 7 \\ 1 & -14 & 13 \end{pmatrix}$ $E_{-2} = \ker(A + 2I) = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Étape 4 : Matrices de passage et diagonale On fait bien attention à garder le même ordre pour les valeurs propres et les vecteurs propres. On pose

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Conclusion La matrice A est la matrice d'une application linéaire f dans la base canonique, D est la matrice de f dans la base de vecteurs propres $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$, P est la matrice de passage de la base canonique à la base de vecteurs propres, on a donc la relation :

$$A = PDP^{-1}$$